

**1**

(1)  $8(1 + \sqrt{2})$

(2)  $a > 10$

(3)  $52 - 20\sqrt{6} + \frac{\sqrt{35}}{2}$

(4)  $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{15}}{3}, \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{3}$

(5)  $a = \frac{11}{4}, \quad b = 9$

**2**

(1) 余弦定理より  $6^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos B$  より  $\cos B = \frac{1}{8}$  を得る.

(2) 余弦定理より

$$\cos A = \frac{4^2 + 6^2 - 5^2}{2 \times 4 \times 6} = \frac{9}{16} > 0$$

$$\cos B = \frac{1}{8} > 0$$

$$\cos C = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{3}{4} > 0$$

を得る. すべての余弦の値が正であるから, すべての角は大きさは,  $90^\circ$  より小さい.

(3)  $\sin B > 0$  より  $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$  である. よって正弦定理より

$$R = \frac{CA}{\sin B} = \frac{16\sqrt{7}}{7}$$

を得る.

**3**

(1) 重解を持つのは, 判別式  $D = a^2 - 4b = 0$  のときである.  $a$  と  $b$  は正であるから,  $a = 2\sqrt{b}$  である. さて  $a$  は自然数であるから,  $b = 1, 4$  以外はない.  $b = 1$  のときは  $a = 2$ ,  $b = 4$  のときは,  $a = 4$  である. よって重解となるのは2通りある.  $a$  と  $b$  の組み合わせは16通りであるから, 重解となる確率は

$$\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

である.

(2) グラフが  $x$  軸と共有点を持つので、 $D \geq 0$  である。さらに共有点が整数となるのは、 $D$  は自然数の 2 乗でなければならない。これを満たす  $(a, b)$  は、

$$(a, b) = (2, 1), (3, 2), (4, 3), (4, 4)$$

である。それぞれの方程式を解くと、

$$(a, b) = (2, 1) \text{ のときは } x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 = 0 \text{ より解は } x = -1 \text{ である。}$$

$$(a, b) = (3, 2) \text{ のときは } x^2 + 3x + 2 = (x + 2)(x + 1) = 0 \text{ より解は } x = -1, -2 \text{ である。}$$

$$(a, b) = (4, 3) \text{ のときは } x^2 + 4x + 3 = (x + 3)(x + 1) = 0 \text{ より解は } x = -1, -3 \text{ である。}$$

$$(a, b) = (4, 4) \text{ のときは } x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2 = 0 \text{ より解は } x = -2 \text{ である。}$$

よって、求める確率は、 $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$  である。

**4**

(1)  $4^n$  が 13 桁の整数あるから、 $10^{12} \leq 4^n < 10^{13}$  を満たす。 $\log_{10} 2 = 0.3010$  より  $\log_{10} 4^n = 2n \log_{10} 2 = 0.602n$  である。よって  $12 \leq 0.602n < 13$  より  $19.93 \leq n < 21.59$  であるから  $n = 20, 21$  を得る。

(2) 両辺に  $(x - 1)(x + 1)^2$  をかけると

$$7x^2 + 7x + 6 = a(x + 1)^2 + b(x - 1)(x + 1) + c(x - 1)$$

を得る。この両辺に

- $x = 1$  を代入すると  $20 = 4a$  を得るので  $a = 5$  である。
- $x = -1$  を代入すると  $6 = -2c$  を得るので  $c = -3$  である。
- $x = 0$  を代入すると  $6 = a - b - c$  を得るが、 $a = 5$ 、 $c = -3$  なので  $b = 2$  である。

最後に  $a = 5$ 、 $b = 2$ 、 $c = -3$  を与式の右辺に代入し、まとめると右辺を得る。よって恒等式を得る。

(3) 加法定理より

$$A \cos(\theta + \alpha) = A \cos \theta \cos \alpha - A \sin \theta \sin \alpha$$

$$A \sin(\theta + \beta) = A \cos \theta \sin \beta + A \sin \theta \cos \beta$$

よって、それぞれ  $4 \cos \theta - 5 \sin \theta$  に等しいので、 $\cos \alpha = \frac{4}{A}$ 、 $\sin \alpha = \frac{5}{A}$ 、 $\cos \beta = -\frac{5}{A}$ 、 $\sin \beta = \frac{4}{A}$  である。よって

$$1 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = \cos^2 \beta + \sin^2 \beta = \frac{41}{A^2} \Rightarrow A^2 = 41$$

であるから、 $A > 0$  より  $A = \sqrt{41}$  を得る。さらに加法定理より

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{A} \times \left(-\frac{5}{A}\right) + \frac{5}{A} \times \frac{4}{A} = 0$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{5}{A} \times \left(-\frac{5}{A}\right) - \frac{5}{A} \times \frac{4}{A} = -\frac{41}{A^2} = -1$$

を得る. 以上から  $A = \sqrt{41}$ ,  $\cos(\alpha - \beta) = 0$ ,  $\sin(\alpha - \beta) = -1$  である.

**5**

**問題1**

(1) 漸化式より  $n \geq 2$  のとき

$$\begin{aligned} D_n &= a_{n+1} - a_n = 2a_n + 3n - 2 - (2a_{n-1} + 3(n-1) - 2) \\ &= 2(a_n - a_{n-1}) + 3 = 2D_{n-1} + 3 \end{aligned}$$

より,  $D_n = 2D_{n-1} + 3$  を得る. これより  $D_n + 3 = 2(D_{n-1} + 3)$  が成立するので,  $D_n + 3$  は 公比 2, 初項  $D_1 + 3 = a_2 - a_1 + 3 = 5$  の等比数列である. 以上から  $D_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$  を得る.

(2)  $D_n$  は数列  $a_n$  の階差数列であるから

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} D_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (5 \cdot 2^{k-1} - 3) = 1 + 5 \times \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} - 3(n-1) = 5 \cdot 2^{n-1} - 3n - 1$$

即ち  $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3n - 1$  である. なお  $n = 1$  のとき,  $5 \cdot 2^{1-1} - 3 - 1 = 1$  であるから,  $n = 1$  のときも成立する.

**問題2**

(1)  $\vec{e} = (a, b)$  とおく.  $|\vec{e}| = 1$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{e} = 0$  より,  $a^2 + b^2 = 1$ ,  $2a + 3b = 0$  で

あるから,  $a = \pm \frac{3\sqrt{13}}{13}$ ,  $b = \mp \frac{2\sqrt{13}}{13}$  (複合同順) を得る.

(2)  $\vec{p}$  が満たすベクトル方程式は,  $t$  を任意の実数とし複合同順で

$$\vec{p} = (3, -1) + t\vec{e} = (3, -1) + t \left( \pm \frac{3\sqrt{13}}{13}, \mp \frac{2\sqrt{13}}{13} \right) = (3, -1) \pm \frac{\sqrt{13}}{13} t (3, -2)$$

である. よって,  $s = \pm \frac{\sqrt{13}}{13} t$  とおくと  $\vec{p} = (3s+3, -2s-1)$  である. よって,  $X = 3s+3$ ,  $Y = -2s-1$  を得る. ただし  $s$  は任意の実数である.